

• ΛΥΚΕΙΟ • ΓΥΜΝΑΣΙΟ • ΕΠΑΛ • ΔΗΜΟΤΙΚΟ • ΜΕΛΕΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΓΝΩΣΗ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ

**ΧΙΩΤΗΣ**



ΑΕΙ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

**ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ**

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - [www.hiotis.edu.gr](http://www.hiotis.edu.gr)

### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

### ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

#### ΘΕΜΑ Α

A1) Γ

A2) Γ

A3) Β

A4) Γ

A5) Δ

#### ΘΕΜΑ Β

B1)

1) Β

2) Γ

3) Β

4) Β

5) Α

6) Γ

B2)

A) Με τη μεταγραφή, οι πληροφορίες που βρίσκονται στα γονίδια μεταφέρονται στο mRNA με βάση τη συμπληρωματικότητα των νουκλεοτιδικών βάσεων. Η αλληλουχία των βάσεων του mRNA

καθορίζει την αλληλουχία των αμινοξέων στις πρωτεΐνες με βάση έναν κώδικα αντιστοίχισης νουκλεοτιδίων mRNA με αμινοξέα πρωτεϊνών, ο οποίος ονομάζεται γενετικός κώδικας.

**Β)** Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ύστερα από ειδική επεξεργασία, τα ινίδια χρωματίνης μοιάζουν με κομπολόγια από χάντρες. Κάθε «χάντρα» ονομάζεται νουκλεόσωμα και αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης. Το νουκλεόσωμα αποτελείται από DNA μήκους 146 ζευγών βάσεων και από οκτώ μόρια πρωτεϊνών, που ονομάζονται ιστόνες. Το DNA είναι τυλιγμένο γύρω από το οκταμερές των ιστονών .

**Γ)** Χαρτογράφηση είναι ο εντοπισμός της θέσης των γονιδίων στα χρωμοσώματα, και ο προσδιορισμός της αλληλουχίας των βάσεων του DNA στο ανθρώπινο γονιδίωμα.

**Β3)**

Επιχιασμός , Ανεξάρτητος συνδυασμός των χρωμοσωμάτων , Μεταλλάξεις , Τυχαίος συνδυασμός γαμετών κατά τη γονιμοποίηση.

Η γενετική ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τους αμφιγονικά αναπαραγόμενους οργανισμούς, έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη. Μερικοί από τους συνδυασμούς γονιδίων (άρα και γνωρισμάτων που επηρεάζονται από τα γονίδια αυτά) είναι επιτυχέστεροι απ' ό,τι άλλοι, με την έννοια ότι προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης στο φορέα τους σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο μηχανισμός αυτός συμβάλλει στην εξέλιξη, γιατί κάθε πληθυσμός περνά στις επόμενες γενιές του πιο ευνοϊκούς συνδυασμούς γονιδίων και γνωρισμάτων.

**Β4)** Οι χλωροπλάστες ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία οργανιδίων των φυτικών κυττάρων, που ονομάζονται πλαστίδια. Στα πλαστίδια ανήκουν και οι άχρωμοι αμυλοπλάστες, που βρίσκονται στα κύτταρα των ριζών των φυτών και αποτελούν αποθήκες αμύλου, καθώς επίσης οι χρωμοπλάστες, που περιέχουν χρωστικές και βρίσκονται στα άνθη, στα φύλλα και στους καρπούς.

## ΘΕΜΑ Γ

### Γ1.

Παρατηρείται φαινοτυπική διαφορά μεταξύ αρσενικών και θηλυκών της F2 γενιάς, συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι η παραγωγή του ενός ενζύμου ελέγχεται από φυλοσύνδετο γονίδιο. Έπειτα από διερεύνηση βρίσκουμε ότι η παραγωγή του ενζύμου E1 ελέγχεται από αυτοσωμικό επικρατές και η παραγωγή του ενζύμου E2 από φυλοσύνδετο επικρατές.

Άρα

A: αλληλόμορφο για παραγωγή E1

a: αλληλόμορφο για μη παραγωγή E1

X<sup>B</sup>: αλληλόμορφο για παραγωγή E2

x<sup>b</sup>: αλληλόμορφο για μη παραγωγή E2

**P1 γενιά:** ααX<sup>B</sup>X<sup>B</sup> ⊗ ΑΑΧ<sup>β</sup>Υ

**Γαμέτες:** αX<sup>B</sup> ⊗ ΑΧ<sup>β</sup>, ΑΥ

**F1 γενιά:** ΑαX<sup>B</sup>X<sup>β</sup> και ΑαΧ<sup>β</sup>Υ (όλα πορτοκαλί)

Διασταύρωση F1 γενιάς: ΑαX<sup>B</sup>X<sup>β</sup> ⊗ ΑαΧ<sup>β</sup>Υ

**Γαμέτες:** ΑΧ<sup>B</sup>, ΑΧ<sup>β</sup>, αΧ<sup>B</sup>, αΧ<sup>β</sup> ⊗ ΑΧ<sup>β</sup>, ΑΥ, αΧ<sup>β</sup>, αΥ

	AΧ <sup>B</sup>	AΧ <sup>β</sup>	αΧ <sup>B</sup>	αΧ <sup>β</sup>
AΧ <sup>B</sup>	ΑΑΧ <sup>B</sup> X <sup>B</sup>	ΑΑΧ <sup>B</sup> X <sup>β</sup>	ΑαΧ <sup>B</sup> X <sup>B</sup>	ΑαΧ <sup>B</sup> X <sup>β</sup>
ΑΥ	ΑΑΧ <sup>B</sup> Υ	ΑΑΧ <sup>β</sup> Υ	ΑαΧ <sup>B</sup> Υ	ΑαΧ <sup>β</sup> Υ
αΧ <sup>B</sup>	ΑαΧ <sup>B</sup> X <sup>B</sup>	ΑαΧ <sup>B</sup> X <sup>β</sup>	ααΧ <sup>B</sup> X <sup>B</sup>	ααΧ <sup>B</sup> X <sup>β</sup>
αΥ	ΑαΧ <sup>B</sup> Υ	ΑαΧ <sup>β</sup> Υ	ααΧ <sup>B</sup> Υ	ααΧ <sup>β</sup> Υ

Φ.Α.:

6/16 θηλυκά με πορτοκαλί χρώμα πτερώματος

2/16 θηλυκά με κίτρινο χρώμα πτερώματος

3/16 αρσενικά με πορτοκαλί χρώμα πτερώματος

3/16 αρσενικά με κόκκινο χρώμα πτερώματος

1/16 αρσενικά με κίτρινο χρώμα πτερώματος

1/16 αρσενικά με λευκό χρώμα πτερώματος

**Γ2. P1 γενιά:**  $aX^{B^B} \otimes AAX^{BY}$

**F1 γενιά:**  $AaX^{B^B}$  και  $AaX^{BY}$

**Γ3.** Η ασθένεια κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας, επομένως θέτουμε συμβολισμό:

$X^A$ : φυσιολογικό επικρατές αλληλόμορφο

$X^a$ : υπολειπόμενο που ελέγχει την ασθένεια

Μη αναμενόμενο φαινότυπο εμφανίζουν τα άτομα II4 και III1.

Παρατηρούμε από το γενεαλογικό δέντρο ότι το άτομο II4 είναι υγιές, επομένως θα έπρεπε να έχει γονότυπο  $X^AY$ , έχοντας λάβει  $X^A$  από τη μητέρα II2. Ωστόσο, το άτομο II2 πάσχει και μεταβιβάζει μόνο υπολειπόμενα αλληλόμορφα στους απογόνους της, επομένως και ο γιος II4 θα έπρεπε να λάβει αλληλόμορφο  $X^a$  και να πάσχει.

Επίσης, το άτομο III1 πάσχει, επομένως θα έπρεπε να έχει λάβει ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο από κάθε γονέα. Ο πατέρας της II3, ωστόσο, είναι υγιής και θα έχει γονότυπο  $X^AY$ , επομένως δεν είναι δυνατόν να της μεταβιβάσει παθολογικό αλληλόμορφο. Άρα ο φαινότυπός της είναι μη αναμενόμενος.

**Γ4.** II4:  $X^AX^aY$  τρισωμία XXY – Σύνδρομο Klinefelter

Ο ανιχνευτής A υβριδοποιείται δύο φορές με το κεντρομερίδιο των μεταφασικών χρωμοσωμάτων X, επομένως το άτομο φέρει δύο φυλετικά χρωμοσώματα X, αντί ενός που έχει φυσιολογικά. Επιπλέον, ο ανιχνευτής B υβριδοποιείται με το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο 2 φορές στη μετάφαση, επομένως το άτομο είναι ετερόζυγο και φέρει στο ένα μεταφασικό χρωμόσωμα X δύο υπολειπόμενα αλληλόμορφα.

### III1.X<sup>a</sup>X<sup>c</sup>

Ο ανιχνευτής A υβριδοποιείται δύο φορές με το κεντρομερίδιο των μεταφασικών χρωμοσωμάτων X, επομένως το άτομο φέρει δύο φυλετικά χρωμοσώματα X. Επιπλέον, ο ανιχνευτής B υβριδοποιείται με το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο 2 φορές στη μετάφαση, επομένως το άτομο είναι ετερόζυγο και μόνο ένα υπολειπόμενο μεταλλαγμένο, αντί των δύο που θα έπρεπε να φέρει φυσιολογικά, εφόσον πάσχει.

### Γ5. II4: X<sup>A</sup>X<sup>a</sup>Y τρισωμία XXY – Σύνδρομο Klinefelter

Το άτομο προέκυψε από μη φυσιολογικό ζυγωτό με αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία. Φυσιολογικό ωάριο με ένα φυλετικό χρωμόσωμα (X<sup>a</sup>) γονιμοποιήθηκε από μη φυσιολογικό σπερματοζωάριο με δύο φυλετικά χρωμοσώματα (X<sup>A</sup>Y), λόγω μη διαχωρισμού των φυλετικών χρωμοσωμάτων στη μειωτική διαίρεση I του πατέρα.

### III1: X<sup>a</sup>X<sup>c</sup>

Το άτομο φέρει δομική χρωμοσωμική ανωμαλία και συγκεκριμένα έλλειψη τμήματος του χρωμοσώματος που φέρει το επικρατές X<sup>A</sup>.

Το άτομο προήλθε από μη φυσιολογικό ζυγωτό, το οποίο προέκυψε από φυσιολογικό ωάριο με X<sup>a</sup> με μη φυσιολογικό σπερματοζωάριο στο οποίο συνέβη είτε έλλειψη του χρωμοσωμικού τμήματος που φέρει το επικρατές X<sup>A</sup> είτε μετατόπισή του σε μη ομόλογο χρωμόσωμα που δεν κληροδοτήθηκε στο άτομο III1.

## ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.** α) αλυσίδα I – αριστερά 5' άκρο και δεξιά 3' άκρο

Αλυσίδα II – αριστερά 3' άκρο και δεξιά 5' άκρο

β) Η κωδική αλυσίδα του γονιδίου μεταγραφικού παράγοντα (MA) είναι η αλυσίδα I

Η κωδική αλυσίδα του γονιδίου του φαρμακευτικού πεπτιδίου B είναι η αλυσίδα II

γ) Το ασυνεχές γονίδιο είναι το γονίδιο του πενταπεπτιδίου με φαρμακευτική δράση (γονίδιο B)

**Δ2.** Μας αναφέρεται ότι το τμήμα μεταξύ των σημείων K και Λ αποσπάται και επανασυνδέεται μετά από αναστροφή. Κατά την επανασύνδεση, δημιουργούνται 3'-5' φωσφοδιεστερικοί δεσμοί στα δύο σημεία σύνδεσης.

Έτσι δημιουργείται η εξής αλληλουχία.

YA 5'- CCGGCTGCAGATGTTTCTAAAAGGGGTTTCATTAA CGAATCCCGGG-3' YB  
3' – GGCCGACGTCTACAAAGATTTTCCCCAAGTAATTGCTTAAGGGCCC-5'

Παρατηρούμε ότι το γονίδιο MA έχει συνδεθεί με το 3' άκρο της μη κωδικής του αλυσίδας προς τον υποκινητή του γονιδίου B ενώ το γονίδιο B έχει συνδεθεί αντίστοιχα με το 3' άκρο της μη κωδικής του προς τον υποκινητή του γονιδίου A.

Γνωρίζουμε ότι για να ξεκινήσει η μεταγραφή ενός γονιδίου θα πρέπει το ένζυμο RNA πολυμεράση να προσδεθεί στον υποκινητή που αποτελεί μια ειδική αλληλουχία DNA πριν την αρχή ενός γονιδίου. Στην συνέχεια το ίδιο ένζυμο προκαλεί τοπικό ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA. Τοποθετεί ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια μίας αλυσίδας του DNA σύμφωνα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων, όπως και στην αντιγραφή, με τη διαφορά ότι εδώ απέναντι από την αδενίνη τοποθετείται το ριβονουκλεοτίδιο που περιέχει ουρακίλη. Η RNA πολυμεράση συνδέει τα ριβονουκλεοτίδια που προστίθενται το ένα μετά το άλλο, με 3'-5' φωσφοδιεστερικό δεσμό. Η μεταγραφή έχει προσανατολισμό 5'→3' όπως και η αντιγραφή. Η σύνθεση του RNA σταματά στο τέλος του γονιδίου, όπου ειδικές αλληλουχίες οι οποίες ονομάζονται αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής, επιτρέπουν την απελευθέρωσή του. Το μόριο RNA που συντίθεται είναι συμπληρωματικό προς τη μία αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA του γονιδίου. Η αλυσίδα αυτή είναι η μεταγραφόμενη και ονομάζεται μη κωδική. Η συμπληρωματική αλυσίδα του DNA του γονιδίου ονομάζεται κωδική. Όλες οι συμπληρωματικές αλυσίδες είναι μεταξύ τους και αντιπαράλληλες.

Συμπερασματικά η μεταγραφόμενη αλυσίδα (μη κωδική) έχει 3' άκρο στον υποκινητή έτσι ώστε το mRNA να συντεθεί συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο προς αυτήν με προσανατολισμό 5'→3', ενώ η κωδική αλυσίδα του γονιδίου έχει 5' άκρο στον υποκινητή.

Με βάση τα παραπάνω κατανοούμε ότι η μεταγραφή αμφότερων των γονιδίων MA και B θα είναι εφικτή μετά την αναστροφή, καθώς πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Η μεταγραφή του MA θα ξεκινήσει με την πρόσδεση της RNA πολυμεράσης στον υποκινητή YB ενώ η μεταγραφή του γονιδίου B θα ξεκινήσει με την πρόσδεση της RNA πολυμεράσης στον υποκινητή YA.

**Δ3.** Για την ενσωμάτωση του φυσιολογικού τμήματος DNA ώστε να εκφραστεί το γονίδιο της φαρμακευτικής πρωτεΐνης θα χρησιμοποιηθούν οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες I και II. Το γονίδιο θα ενσωματωθεί εντός του γονιδίου *gfp* του πλασμιδίου, που κωδικοποιεί την πράσινη φθορίζουσα χρωστική μόνο με έναν προσανατολισμό εξαιτίας των διαφορετικών μονόκλωνων άκρων που αφήνουν οι δύο ενδονουκλεάσες. Ο διαχωρισμός των μετασχηματισμένων από τα μη μετασχηματισμένα βακτήρια θα γίνει με καλλιέργεια των βακτηρίων παρουσία του αντιβιοτικού αμπικιλίνη. Ο διαχωρισμός των μετασχηματισμένων βακτηρίων με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, από τα μετασχηματισμένα βακτήρια με μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο θα

γίνει από την απουσία ή παρουσία πράσινης χρωστικής , αντίστοιχα, όταν υπάρξει έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.

**Δ4.** Το πεπτίδιο που παράγεται δεν είναι λειτουργικό, καθώς το γονίδιο διαθέτει εσώνιο. Τα βακτήρια δεν διαθέτουν μηχανισμούς ωρίμανσης του mRNA, επομένως θα μεταφράσουν το παραγόμενο mRNA μαζί με την αλληλουχία του εσωνίου και θα παραχθεί διαφορετικό πεπτίδιο από το φυσιολογικό.