



Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1^ο

- 1.1** α
- 1.2** γ
- 1.3** γ
- 1.4** α. αυτοκατάλυση, οξείδωση, σκουριά
β. θερμοκρασία, pH
- 1.5** $1 \rightarrow \beta, 2 \rightarrow \delta, 3 \rightarrow \varepsilon, 4 \rightarrow \gamma, 5 \rightarrow \alpha.$

ΘΕΜΑ 2^ο

Ερωτήσεις τύπου σωστό-λάθος

- 2.1** Λ, γιατί μεταξύ των μορίων της $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ αναπτύσσονται ισχυρότερες διαμοριακές δυνάμεις (δεσμοί υδρογόνου) από ό,τι μεταξύ των μορίων του CH_3OCH_3 (δυνάμεις διπόλου-διπόλου) και συνεπώς, στην ίδια θερμοκρασία, θα ισχεί $\text{P}_{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}}^{\text{O}} < \text{P}_{\text{CH}_3\text{OCH}_3}^{\text{O}}$
- 2.2** Σ, είναι $\Delta H_f^{\text{O}}(\text{στοιχείου}) = 0$ μόνο για τη σταθερότερη μορφή του στοιχείου.

- 2.3** Λ, γιατί η τιμή της K_c δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της πίεσης.

2.4

- α. Η στοιχειώδης αντίδραση με τη μικρότερη ταχύτητα και άρα με τη μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή η $A + 2B \rightarrow \Delta$, καθορίζει και το νόμο της ταχύτητας, οπότε για τη συνολική αντίδραση ισχύει:

Νόμος ταχύτητας: $v = k[A][B]^2$, αντίδραση τρίτης τάξης.

- β. Αν διπλασιάσουμε τη συγκέντρωση του B ($[B]' = 2[B]$), η αρχική ταχύτητα υ' υπολογίζεται με βάση το νόμο της ταχύτητας:

$$v' = k[A][B]'^2 = k[A](2[B])^2 = 4k[A][B]^2 \text{ και επειδή } v = k[A][B]^2$$

θα είναι:

$v' = 4v$, δηλαδή η αρχική ταχύτητα τετραπλασιάζεται.

- γ. Η ταχύτητα της αντίδρασης ελαττώνεται με ελάττωση της πίεσης (σε σταθερή θερμοκρασία) άρα με αύξηση του όγκου του δοχείου:

- Αρχική ταχύτητα σε όγκο δοχείου V: $v = k[A][B]^2$ ή $v = k \frac{n_A}{V} \left(\frac{n_B}{V} \right)^2$ (1)

- Αρχική ταχύτητα σε όγκο δοχείου $V' > V$: $v' = k[A][B]^2$

$$v' = k \frac{n_A}{V'} \left(\frac{n_B}{V'} \right)^2 \quad (2)$$


Επιθυμούμε $v' = \frac{v}{27}$ οπότε με αντικατάσταση των (1) και (2) προκύπτει:

$$27k \frac{n_A n_B^2}{V'^3} = k \frac{n_A n_B^2}{V^3} \text{ ή } V' = 3V$$

δηλαδή πρέπει να τριπλασιάσουμε τον όγκο του δοχείου.

ΘΕΜΑ 3^o


- α. Η θερμοχημική εξίσωση της πλήρους καύσης της μεθανόλης είναι:



- β. Η μάζα της μεθανόλης είναι $m = \rho \cdot V$ ή $m = 0,8 \text{ g/mL} \cdot 4 \text{ mL} = 3,2 \text{ g}$

οπότε ο αριθμός mol της CH₃OH ($M_r = 32$) βρίσκεται $n = \frac{m}{M_r}$ ή $n = \frac{3,2 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0,1 \text{ mol}$

Το ποσό θερμότητας που ελευθερώθηκε από την καύση της CH₃OH υπολογίζεται:



Άρα ελευθερώθηκαν 72 kJ.

- γ. Το εκλωόμενο ποσό θερμότητας απορροφάται από το θερμιδόμετρο και από το νερό, του οποίου η θερμοκρασία αυξάνεται κατά $\Delta\theta = 15 - 10 = 5^\circ\text{C}$.


Εφαρμόζοντας την εξίσωση της θερμιδομετρίας παίρνουμε

$$q = (m \cdot c + C) \Delta\theta \text{ ή } c = \frac{q}{\Delta\theta} \text{ ή } c = \frac{\frac{72 \text{ kJ}}{5^\circ\text{C}}}{\frac{2 \text{ kg}}{2 \text{ kg}}} = 4,18 \text{ kJ/kg} \cdot {}^\circ\text{C}$$

δηλαδή η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού είναι 4,18 kJ/kg ${}^\circ\text{C}$

ΘΕΜΑ 4^o

- α. Στο δοχείο εισάγεται, μαζί με το SO₂, ισομοριακή ποσότητα O₂, δηλαδή ίσου αριθμού mol, οπότε οι αρχικές ποσότητες των δύο αερίων στο δοχείο είναι $n_{\text{SO}_2} = n_{\text{O}_2} = 6 \text{ mol}$:



Αρχικά(mol)	:	6	6	-
Αντιδρ./Παράγονται(mol):		-2x	-x	+2x
Χημική ισορροπία(mol):		6-2x	6-x	2x

Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας ισχύει:

- $n_{SO_3} = n_{O_2}$ ή $2x = 6 - x$ ή $x = 2\text{mol}$

οπότε το μίγμα ισορροπίας αποτελείται από 2mol SO_2 , 4mol O_2 και 4mol SO_3 και συνεπώς οι μερικές πιέσεις των τριών αερίων είναι:

$$P_{SO_2} = \frac{n_{SO_2}}{n_{O_2}} \cdot P_{O_2} \text{ ή } P_{SO_2} = \frac{2\text{mol}}{(2+4+4)\text{mol}} \cdot 1\text{atm} = 0,2\text{atm}$$

$$P_{O_2} = \frac{n_{O_2}}{n_{O_2}} \cdot P_{O_2} \text{ ή } P_{O_2} = \frac{4\text{mol}}{(2+4+4)\text{mol}} \cdot 1\text{atm} = 0,4\text{atm}$$

$$P_{SO_3} = \frac{n_{SO_3}}{n_{O_2}} \cdot P_{O_2} \text{ ή } P_{SO_3} = \frac{4\text{mol}}{(2+4+4)\text{mol}} \cdot 1\text{atm} = 0,4\text{atm}$$

- $K_p = \frac{P_{SO_3}^2}{P_{SO_2}^2 \cdot P_{O_2}}$ ή $K_p = \frac{(0,4\text{atm})^2}{(0,2\text{atm})^2 \cdot 0,4\text{atm}} = 10\text{atm}^{-1}$

β. Αν η αντίδραση ήταν μονόδρομη θα παράγονταν 6mol SO_3 (το O_2 βρίσκεται σε περίσσεια), οπότε η απόδοση παραγωγής SO_3 βρίσκεται

$$\alpha = \frac{n_{SO_3,\text{πρακτικά}}}{n_{SO_3,\text{θεωρητικά}}} \cdot 100 \text{ ή } \alpha = \frac{4\text{mol}}{6\text{mol}} \cdot 100 = 66,7\%$$

γ. Για να αυξηθεί η απόδοση παραγωγής SO_3 , θα πρέπει η ισορροπία να μετατοπιστεί προς τα δεξιά, προς την εξώθερμη δηλαδή αντίδραση. Αυτό επιτυγχάνεται με ελάττωση της θερμοκρασίας, η οποία γενικά ευνοεί τις εξώθερμες αντιδράσεις.

